



⑦ ウンチが変

ウンチが変。
ウンチの色がおかしい

問い合わせ
電話相談
#8000

次のうちどの症状がみられますか？

- 白っぽいウンチで、皮膚や白目が黄色っぽい（黄疸？）。
- クリーム色の下痢便。
- コールタールみたいな黒くて粘っこい便。
- コーヒー豆をすりつぶしたカスのようななかたまりが混じっている。
- いちごジャムみたいなウンチをして、機嫌が悪い。お腹も痛そうだ。
- 真っ赤な血液がウンチの中まで混ざっている血便。あるいは血液そのもの。

- 抗生素質を飲んだあと下痢で、便が赤っぽい（とくに、粉ミルクをのんでいるとき）。
- ウンチの周りに新しい血液がついている。トイレットペーパーにも糸を引いたような血液がつく。
- 肛門を痛がる。
- ウンチをした後に、便器に血液がついている。

- ウンチ自体が赤っぽく、おしっこも赤っぽい、赤い着色料の入った食品を食べた。
- 黒い便をするが、元気である。鉄剤を飲んだ？
- 下痢止めを飲んだ。
- ブルーベリーをたくさん食べた。
- ほうれん草のような緑色野菜をたくさん食べた。

この欄に1つ以上「はい」がある

救急医療機関を受診してください。

左の欄に「はい」ではなく、この欄に「はい」がある

様子をみながら診療時間になるのを待ってお子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

この欄にしか「はい」がない

受診の必要はありません。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。



⑧ おしっこが出ない

おしっこが少ない
おしっこが出ない

問い合わせ
電話相談
#8000

次の症状はみられますか？

- ボーッとしており、元気がない。
- 朝から、水分を飲んでない。
- 吐く、もどす、嘔吐がある。
- 下痢がある。
- 涙がでなく、口唇が乾燥している。
- 熱がある。
- ぐったりしている。
- おしっこをするのを嫌がり、オチンチンやおまた（外陰部）を痛がる。
- おしっこをするのを嫌がり、おなかがはっている。

症状がみられるものを「はい」とした場合…

日中、暑いところにずっといた。

発熱が
38度以上
なし

元気が
なし
ある

水分を補給し、涼しいところで安静にしましょう。

「はい」が

1つ以上
なし

救急医療機関を受診してください。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。